



FOTO: JAN BENGTSSON

## Strand- och svämskogar

### Kännetecken

Ett rikligt lövinslag med inslag av död lövved samt spår av återkommande översvämningar.

#### MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN

- Lövrika svämskogar lämnas helt
- Hela eller merparten av svämskogens översvämningsszon ingår i biotopen.

#### NATURVÄRDEN (alla måste inte vara uppfyllda)

- Rikligt lövinslag (> 50%)
- Tydligt inslag av död lövved i exponerat läge
- Återkommande översvämningar, vilket numer är en ovanlig störningsform
- Jordblottor
- Nipor





FOTO: JAN BENGTSSON

Lunglav växer framförallt på gamla lövträd och föredrar ett fuktigt lokalklimat.



FOTO: JOHAN NITARE

Knärot



FOTO: JAN BENGTSSON

Bollvitmossa

## Beskrivning

Avser friska-blöta skogsmiljöer i anslutning till sjöar eller vattendrag med ringa påverkan av tidigare skogsbruksåtgärder där den naturliga vattenståndsfuktuation påtagligt betingar biotopens utseende och funktion.

Den tidvisa översvämningen leder till en vattenmättad markprofil med låg tillgång till syre under delar av vegetationssäsongen samt flöden av växtmaterial och

sediment till och från biotopen. Förutom sedimentation och flöden av växtmaterial (ex, fallförrna) kan frysning med tillhörande markrörelser påverka miljön. I anslutning till större vattendrag med rikliga vattenflöden skapar erosions- och sedimentationsprocesser olika typer av strandmiljöer såsom nipor och strandvallar.

Om miljön dessutom är rik på död ved utvecklas ofta en rik moss-lavflora.

